

## Hinweise vor der Operation in der Klinik für MIC

### Nüchternheit:

**6 Stunden** vorher bitte nicht essen und rauchen (auch keinen Kaugummi oder Bonbon).

**Bis 2 Stunden** vorher können 1 – 2 Gläser klare Flüssigkeit getrunken werden (Wasser, Tee, Kaffee – **KEINE** Milch).

### Medikamente:

Bitte nehmen Sie am **OP-Tag** Ihre Medikamente mit Wasser ein.

### Ausnahmen:

Am **OP-Tag** kein **Heparin** oder ähnliches Medikament zur Blutverdünnung nehmen.

**Metformin** bitte **letztmalig am Morgen des Vortages** einnehmen.

Bitte nehmen Sie an den 8 Tagen vor der Operation keine **Aspirin/ASS-**

**Schmerztabletten** ein, es sei denn, Sie nehmen ASS 100 wegen einer Durchblutungsstörung/Stents. Erlaubt sind bei Bedarf Ibuprofen, Diclofenac, Paracetamol, Novalgin.

Einnahme bzw. Umstellung blutgerinnungshemmender Medikamente:

Medikament	Letzte Einnahme vor OP	Umstellung auf Heparin

### Sonstiges:

Am **OP-Tag** bitte duschen.

Falls vorhanden, bitte mitbringen:

**Aktuelle Medikamentenliste (Name, Dosis, Einnahmezeitpunkt)**, CPAP-Gerät, Schrittmacherausweis, Herzpass, Allergiepass.

### Besonderheiten:

Schmuck, Uhren und **Piercings** müssen entfernt werden. Piercings ggf. durch Kunststoffplatzhalter ersetzen. Es kann sonst zu Verletzungen, Verbrennungen oder Druckstellen kommen.

**Gel und Nagellack** (Finger) bitte entfernen, Haare zusammenbinden, Hörgeräte können belassen werden.

Zahnprothesen und Kontaktlinsen bitte entfernen.

## Hinweise vor der Operation in der Klinik für MIC

### Nüchternheit:

**6 Stunden** vorher bitte nicht essen und rauchen (auch keinen Kaugummi oder Bonbon).

**Bis 2 Stunden** vorher können 1 – 2 Gläser klare Flüssigkeit getrunken werden (Wasser, Tee, Kaffee – **KEINE** Milch).

### Medikamente:

Bitte nehmen Sie am **OP-Tag** Ihre Medikamente mit Wasser ein.

### Ausnahmen:

Am **OP-Tag** kein **Heparin** oder ähnliches Medikament zur Blutverdünnung nehmen.

**Metformin** bitte **letztmalig am Morgen des Vortages** einnehmen.

Bitte nehmen Sie an den 8 Tagen vor der Operation keine **Aspirin/ASS-**

**Schmerztabletten** ein, es sei denn, Sie nehmen ASS 100 wegen einer Durchblutungsstörung/Stents. Erlaubt sind bei Bedarf Ibuprofen, Diclofenac, Paracetamol, Novalgin.

Einnahme bzw. Umstellung blutgerinnungshemmender Medikamente:

Medikament	Letzte Einnahme vor OP	Umstellung auf Heparin

### Sonstiges:

Am **OP-Tag** bitte duschen.

Falls vorhanden, bitte mitbringen:

**Aktuelle Medikamentenliste (Name, Dosis, Einnahmezeitpunkt)**, CPAP-Gerät, Schrittmacherausweis, Herzpass, Allergiepass.

### Besonderheiten:

Schmuck, Uhren und **Piercings** müssen entfernt werden. Piercings ggf. durch Kunststoffplatzhalter ersetzen. Es kann sonst zu Verletzungen, Verbrennungen oder Druckstellen kommen.

**Gel und Nagellack** (Finger) bitte entfernen, Haare zusammenbinden, Hörgeräte können belassen werden.


Zahnprothesen und Kontaktlinsen bitte entfernen.

## Informationen zu Schmerztherapie

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

eine wirksame Schmerztherapie ist ein wichtiger Beitrag zu Ihrer raschen Gesundung. Schmerzen können z. B. Ihre Bewegung, Atmung, Konzentration und den Schlaf einschränken.

Um die Therapie für Sie individuell möglichst optimal zu gestalten, benötigen wir Ihre Mithilfe. Dafür benutzen wir eine Punkteskala (0 – 10). Bitte schätzen Sie die Stärke Ihrer Schmerzen ein, damit wir die für Sie passende Behandlung einleiten können.



Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an.


Ihr Anästhesieteam der Klinik für MIC

## Informationen zu Schmerztherapie

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

eine wirksame Schmerztherapie ist ein wichtiger Beitrag zu Ihrer raschen Gesundung. Schmerzen können z. B. Ihre Bewegung, Atmung, Konzentration und den Schlaf einschränken.

Um die Therapie für Sie individuell möglichst optimal zu gestalten, benötigen wir Ihre Mithilfe. Dafür benutzen wir eine Punkteskala (0 – 10). Bitte schätzen Sie die Stärke Ihrer Schmerzen ein, damit wir die für Sie passende Behandlung einleiten können.



Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an.

Ihr Anästhesieteam der Klinik für MIC